


CALFERT BASIC MAGNEZ

NAWÓZ WE

roztwór siarczanu magnezu



Skład [m/m%]

MgO - rozpuszczalny w wodzie - 6,25%

SO₃ - rozpuszczalna w wodzie - 12,5%

OPIS PRODUKTU

CALFERT BASIC MAGNEZ to płynny roztwór siarczanu magnezu, który dostarcza roślinom dwa makroskładniki pokarmowe: magnez i siarkę. Szczególnie polecany jest do upraw roślin wrażliwych na niedobory tych składników pokarmowych oraz wymagających wyższego nimi nawożenia. CALFERT BASIC MAGNEZ dostępny jest w wygodnej płynnej formie, dzięki czemu jego wykorzystanie do zabiegów nawożenia dolistnego lub fertygacji jest bardzo szybkie i łatwe. Nawóz można aplikować w zabiegach nawożenia dolistnego lub fertygacji w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych.

MIESZALNOŚĆ

CALFERT BASIC MAGNEZ można mieszać z większością dostępnych nawozów stosowanych w zabiegu fertygacji lub aplikacji dolistnej. Nawozu nie należy mieszać z preparatami zawierającymi wapń, fosfor lub krzem. Każdorazowo przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej należy wykonać próbę mieszania nawozu z innymi preparatami w mniejszej objętości wody. Sporządzanie mieszanin zbiornikowych jest możliwe tylko na odpowiedzialność użytkownika.

SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO FERTYGACJI

W celu stosowania CALFERT BASIC MAGNEZ wraz z fertygacją należy odmierzoną ilość wstępnie rozpuścić w osobnym zbiorniku. Następnie ze zbiornika, w którym nawóz rozpuszczono w danej ilości wody, za pomocą instalacji nawodnieniowej, nawóz podać pod rośliny w stosunku 1:100 lub innym wynikającym ze specyfikacji wykorzystywanych urządzeń nawodnieniowych. Dawkę wody wykorzystywaną do podlewania roślin należy skalkulować i zmodyfikować w oparciu o przebieg warunków pogodowych, typ i rodzaj gleby, sposób uprawy oraz uwzględnić gatunkowe i odmianowe potrzeby wodne roślin. Po aplikacji preparatu całą instalację należy przepłukać czystą wodą.

SPORZĄDZANIE ROZTWORU DO APLIKACJI DOLISTNEJ

CALFERT BASIC MAGNEZ wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 50% wodą, przy włączonym mieszadle. Po dodaniu do zbiornika wszystkich preparatów należy go wypełnić w całości wodą. Po sporządzeniu cieczy użytkowej należy przystąpić do wykonania aplikacji. Po zabiegu wszystkie elementy urządzenia należy dokładnie umyć czystą wodą.

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o., 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie spożywać, w przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu lub błon śluzowych przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Przestrzegać zasad BHP. Nawóz może powodować zmianę zabarwienia kostki brukowej. Przygotowanie nawozu do aplikacji wykonywać w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu w gospodarstwie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +10°C do +35°C, niebezpośrednio w miejscach operacji słonecznej lub blisko źródła ognia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w zamknięciu. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku rozlania wytrzeć stosując środki ochrony indywidualnej, a zanieczyszczone miejsce dokładnie spłukać wodą. W niskich temperaturach produkt może ulec krystalizacji (jest to proces naturalny).

FERTYGACJA:


ZALECENIA STOSOWANIA

UPRAWA	IŁOŚĆ APLIKACJI W SEZONIE	KONCENTRACJA	DAWKĄ (l na ha)
Truskawka, Jabłoń, Grusza, Wiśnia, Czeresnia, Porzeczka	6	100-250ml w 1000 l pożywki roboczej	5-15 l/ha
Malina, Jeżyna, Borowka	8	50-200 ml w 1000 l pożywki roboczej	5-10 l/ha
Pomidor, Papryka, Ogórek	4-6	50-150 ml w 1000 l pożywki roboczej	5-10 l/ha

Okres przydatności do stosowania: 1 rok

Data produkcji:

Nr i seria:



CALFERT

DOLISTNIE

ZALECENIA STOSOWANIA

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKĄ W l/ha
Zboża ozime	Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-6 liści. Wykonać zabieg wiosną na początku fazy krzewienia i powtórzyć po 7 dniach, kolejny zabieg wykonać na początku strzelenia w zdźbło i powtórzyć po 7-14 dniach	5-20 l/ha
Zboża jare	Pierwszy zabieg wykonać w czasie krzewienia, kolejny w czasie strzelenia w zdźbło. Kolejne 2-3 zabiegi wykonać w fazie liścia flagowego	5-15 l/ha
Rzepak	Wykonać zabieg jesienią w fazie 4-8 liści. Zabiegi wiosną wykonać od momentu intensywnego wzrostu do początku kwitnienia 2-4 zabiegi wykonywać co 7-14 dni.	10-25 l/ha
Burak cukrowy	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-8 liści, kolejny w fazie 9 liści, kolejne zabiegi należy wykonać przed i w czasie zakrywania międzyrzędzi przez masę liściową.	10-20 l/ha
Ziemniak	Wykonać 2-3 zabiegi w czasie intensywnego przyrostu masy zielonej, kolejne zabiegi wykonać w czasie zwarcia rzędów	10-20 l/ha
Kukurydza	Pierwszy zabieg wykonać w fazie 3-5 liści, kolejny w fazie 6-9 liści	10-20 l/ha
Rośliny strączkowe	Pierwszy zabieg wykonać w czasie wzrostu i rozwoju liści, kolejne zabiegi wykonywać w czasie intensywnego wzrostu masy zielonej	10-20 l/ha
Jabłoń, Grusza, Śliwa,	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać po pojawieniu się masy zielonej i powtórzyć 2-4 razy do fazy białego pąka. Kolejne 1-2 zabiegi wykonać po kwitnieniu	5-15 l/ha
Wiśnia, Czeresnia	Pierwsze 2-3 zabiegi wykonać po pojawieniu się masy zielonej i powtórzyć 2-4 razy do fazy białego pąka. Kolejne 1-2 zabiegi po kwitnieniu. Wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców.	10-20 l/ha
Truskawka, Malina, Porzeczka, Borowka, Jeżyna	Wykonać 2-4 zabiegi od początku wegetacji do momentu ukazania się pąków kwiatowych. Kolejne 2-5 zabiegi należy wykonywać po kwitnieniu. Celem poprawy zawiązywania pąków kwiatowych na kolejny rok wykonać 2-3 zabiegi po zbiorach owoców.	5-15 l/ha
Pomidor, Papryka, Ogórek, Dynia	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego wzrostu i rozwoju masy zielonej	5-10 l/ha
Warzywa kapustne, Warzywa liściowe	Pierwsze zabiegi wykonać od momentu rozwoju masy liściowej, kolejne w czasie intensywnego przyrostu liści. Zabiegi wykonać co 7-14 dni	5-20 l/ha
Marchew, Pietruszka, Seler, Cebula, Por	Wykonać 2-4 zabiegi w czasie intensywnego wzrostu i rozwoju masy zielonej, zabiegi wykonać co 7-14 dni	5-15 l/ha

Objętość: **5l**
(masa netto 6 kg)

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o., 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8, tel. 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl