

VitaFer[®] K

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, azotu i fosforu

6,25% N + 10% P₂O₅ + 15% K₂O
+ mikroelementy

VitaFer[®] K to nawóz z zawartością kluczowych dla roślin składników pokarmowych: potasu, fosforu i azotu oraz mikroelementów. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie objawienia się deficytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer[®] K przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

Charakterystyka działania

- Zapopatruje rośliny w potas w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
- Podnosi tolerancję roślin na stresy fizjologiczne, choroby i szkodniki,
- Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
- Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i kluczowych mikroelementów,
- Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
- Poprawia gospodarkę wodną roślin, co podnosi ich tolerancję na suszę,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Buraki cukrowe	2	5	od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39), w odstępach 12-14 dni
Drzewa i krzewy owocowe	2-3	5	od fazy zielonego pąka do końca wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 59-81)
Kukurydza	2	5	od fazy 4 liści (BBCH 15-18)
Rośliny ozdobne*	2-3	0,2-0,5%	dolistnie i do podłoża, w odstępach 12-13 dni
Rzepak	4	4-5	jeden jesienią - od fazy 6 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 16-25), trzy wiosną – od ruszenia wegetacji do początku rozwoju pąków (BBCH 25 -50)
Truskawki	3	5	od formowania białych pąków (BBCH 57-67)
Warzywa	3	5 0,2-0,5%	w gruncie: od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co 12-14 dni; pod osłonami: dolistnie lub doglebowo, 2-3 tygodnie po wysadzeniu co 10-12 dni
Zboża ozime	2	5	od fazy strzelania w źdźbło do grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 31-51)
Ziemniaki	4	5	od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

*(w uprawach połowych, pod osłonami, w doniczkach)

