



VitaFer[®] Ca

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania wapnia

20,25% CaO + mikroelementy
+ naturalne aminokwasy

VitaFer[®] Ca jest nawozem zawierającym wysokie stężenie wapnia oraz mikroelementy. Wzbogacony jest dodatkowo o aminokwasy, które polepszają wchłanianie wapnia przez rośliny i są niezbędne do zwiększania masy roślinnej.

VitaFer[®] Ca zalecany jest do upraw warzywniczych i sadowniczych. Poprawia odporność roślin na choroby i szkodniki, zapewnia prawidłowy rozwój i ma wpływ na poprawienie czynników wpływających na wartość handlową plonów (wybarwienie, jędrność, wielkość, jakość, smak). Dodatkowo poprawia ich zdolności przechowalnicze.

Przed zastosowaniem **VitaFer[®] Ca** zaleca się wcześniej zabieg nawozem **VitaFer[®] EXTRA Ca**.

Charakterystyka działania

- Skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są deficytem wapnia u roślin, który jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ich odporności,
- Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
- Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz wspomaga proces regeneracji roślin,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.
- Zaopatruje rośliny w wapń i inne ważne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie ich przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Drzewa pestkowe	2-3	3 – 5	od początku zawiązywania owoców (BBCH 69), w odstępach 10-14 dni
Drzewa ziarnkowe	2-4	3 – 5	w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89) do 1-2 tyg. przed zbiorem w odstępach 10-12 dni;
Kapusta	2-3	4 – 5	od początku zawiązywania główek (BBCH 19-41)
Pomidory, papryka, ogórki	2-3	4 – 5 (0,4 – 0,6% pod osłonami)	od zawiązywania owoców (BBCH 51-69), w odstępach 14 dni
Sałata, cykoria	2-3	4 – 5	od drugiego tygodnia po wysadzeniu (BBCH 41-45)
Truskawki	2-3	3 – 5	od początku zawiązywania owoców (BBCH 69), w odstępach 10-14 dni

