

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R -47/2012d z dnia 13.02.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 65/2009 z dnia 08.05.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Industrias Químicas del Vallés, S.A., Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallés, Barcelona, Królestwo Hiszpanii, tel.: +34 93 579 66 77, fax: +34 93 593 80 11.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 66 80 790, fax: (48) 66 80 486
e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

Konfeksjonerzy :

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel/fax (48) 63 240 01 18, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. DANMAR Towarzystwo Chemiczne, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.(48) 42 650 95 50, fax. (48) 42 650 66 95 e-mail: biuro@danmar.eu

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

A R M E T I L M 7 2 W P

Zawartość substancji aktywnych:

metalaksyl (związek z grupy fenyloamidów) – 8 %,
DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(2-metoksyacetylo)alaminian metylu
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64 %
kompleks cynku z polimerycznym etylenobis(ditiokarbaminianem)manganawym
zawierający 20% manganu i 2,5% cynku.

**Zezwolenie MRiRW nr R- 65/2009 z dnia 08.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 179/2010d z dnia 22.06.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-47/2012d z dnia 13.02.2012 r.**



drażniący niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

ARMETIL M 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

1. ZIEMNIAK

- alternarioza

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na tę chorobę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach.

W przypadku silnego zagrożenia chorobą zabieg można powtórzyć po siedmiu dniach.

Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.

- zaraza ziemniaka

Zalecana dawka: 2,0 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na uprawach zagęszczonych lub w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaka.

Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka.

Zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub:

- na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,

- na odmianach późniejszych – z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym regionie na odmianach wczesnych.

W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, opryskiwanie środkiem Armetil M 72 WP można powtórzyć po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu.

Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.

Kolejne zabiegi wykonywać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych.

ROŚLINY WARZYWNE

W GRUNCIE

1. POMIDOR

- zaraza ziemniaka

Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na pomidorach lub ziemniakach w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2.CEBULA

- mączniak rzekomy

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, uprawianej z dymki lub siewu ozimego w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Do cieczy użytkowej należy dodawać środki zwiększające przyczepność cieczy użytkowej oraz w miarę możliwości podczas zabiegów stosować dysze o dwustronnym działaniu.

3. OGÓREK

- mączniak rzekomy dyniowatych

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Środek stosować 2 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7-10 dni (tylko do dwóch pierwszych zabiegów) przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA

Armetil M 72 WP nie stosować na 2-3 godziny przed spodziewanym deszczem.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ziemniak, cebula - 14 DNI,

pomidor - 7 DNI,

ogórek - 3 DNI

IV. OKRES PREWENCJI (okres zapobiegający zatruciu)

dla pszczoł, ludzi i zwierząt - nie dotyczy.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
- Chronić przed dziećmi.

- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza o ile to możliwe należy pokazać etykietę.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Rzeszów – (17) 866-40-25

Kraków – (12) 411-99-99

Sosnowiec – (32) 266-11-45

Lublin – (81) 740-89-83

Tarnów – (14) 631-54-09

Łódź – (42) 657-99-00

Warszawa – (22) 619-66-54

Poznań – (61) 847-69-46

Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -