

Goëmar BM 86

NAWÓZ WE

Mieszanina mikrośladników pokarmowych Bor (B) + Molibden (Mo)

Zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

2,07 % boru (B) rozpuszczalnego w wodzie

0,02 % molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie

Masa netto: 1,28 kg / 6,42 kg

Objętość: 1 l / 5 l

Producent:

Laboratoires Goëmar SAS
Parc Technopolitain Atalante CS 41908
35435 Saint-Malo Cedex
Republika Francuska
Tel.: +33 2 99 19 19 19

Dystrybutor:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6 B
01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 866 41 80

Przechowywanie:

- przechowywać w temperaturze od -10°C do 40°C,
- przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku,
- z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,
- w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,

Środki ostrożności:

P102 - chronić przed dziećmi

Goëmar BM 86 został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. Goëmar BM 86 zwiększa intensywność kwitnienia i poprawia zawiązywanie owoców. W uprawach warzyw ogranicza opadanie kwiatów i zawiązków owoców.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Goëmar BM 86 stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie roślin.

Zakres stosowania	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Dawka
Drzewa owocowe	Od stadium zielonego pąka do końca kwitnienia	3	3 l/ha
Truskawka, malina, porzeczka, borówka, agrest	Od początku do końca kwitnienia	3	3 l/ha
Truskawka, malina (pod osłonami)	Od początku kwitnienia, powtarzać co 10-14 dni	3 - 5	0,1%
Pomidor, papryka, ogórek w uprawie polowej	Od początku kwitnienia, powtarzać co 2-3 tygodnie	2 - 3	1,5 - 2 l/ha
Pomidor, papryka, ogórek (pod osłonami)	Od początku kwitnienia, powtarzać co 10-14 dni	3 - 5	0,1%
Fasola szparagowa	Od stadium zielonego pąka do zawiązania pierwszych strąków	2	1,5 - 2 l/ha
Groch na zielono	Od stadium białego pąka do zawiązania pierwszych strąków	2	1,5 - 2 l/ha

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zalecaną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 2/3 potrzebnej objętości (przy włączonym mieszadle). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi nawozami i/lub środkami ochrony roślin, Goëmar BM 86 dodawać do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle).

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu używanego opryskiwacza.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Numer partii: na opakowaniu.

Data produkcji: na opakowaniu.

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata