


WAPNO MIX MICRO

NAWÓZ WE

Typ: Nawóz zawierający wapń i mikroelementy do aplikacji dolistnej



SKŁAD:

Wapń (CaO)
rozpuszczalny w wodzie 15%

Mangan (Mn)
rozpuszczalny w wodzie 0,5%

Cynk (Zn)
rozpuszczalny w wodzie 0,5%

OPIS PRODUKTU

WAPNO MIX MICRO to płynny dolistny nawóz zawierający wysoką koncentrację wapnia oraz cynk i mangan. Nawóz WAPNO MIX MICRO jest wzbogacony specjalnymi organicznymi związkami, które poprawiają pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinie. Dzięki unikalnej kompozycji, WAPNO MIX MICRO bardzo szybko uzupełnia niedobory wapnia w roślinie. Jest polecany do stosowania w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i roślin jagodowych. WAPNO MIX MICRO jest nawozem, który ogranicza występowanie chorób fizjologicznych (np. tip-burn, gorzka plamistość podskórna, sucha zgnilizna wierzchołkowa) spowodowanych niedoborem wapnia lub zaburzeniami w jego transporcie i dostępności.

MIESZALNOŚĆ

WAPNO MIX MICRO nie może być mieszane z produktami alkalicznymi ($\text{pH} < 8$), olejami mineralnymi, siarką, fosforem, związkami na bazie miedzi. Produkt jest kompatybilny z niektórymi środkami ochrony roślin i nawozami. Przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej, każdorazowo sprawdzić możliwość mieszalności preparatów w małej ilości wody.

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ

Wypełnić zbiornik do połowy wodą i wlać odmierzoną ilość preparatu WAPNO MIX MICRO. Następnie wypełnić zbiornik do pełna cały czas mieszając ciecz roboczą. W celu polepszenia nawożenia dolistnego zastosowanie WAPNO MIX MICRO powinno odbyć się wcześniej rano lub wieczorem. Zabieg wykonywać w temperaturze poniżej 20°C i wilgotności powietrza powyżej 70%. Po wykorzystaniu pojemnik po nawozie dobrze wypłukać.

PRZECZYSZCZANIE

Nawóz przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 4 do 35°C. Składowanie w nieodpowiednich warunkach (np. w temp. poniżej 4°C) może prowadzić do nieodwracalnych zmian w jakości nawozu. Produktu nie należy składować warstwami. Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu aż do zużycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C.

Środki ostrożności. Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy stosować preparat zgodnie z etykietą, niewłaściwe zastosowanie preparatu może powodować uszkodzenia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć skórę i ręce po użyciu preparatu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza

P337 + P313 Jeśli dojdzie do porażenia oczu, należy skontaktować się z lekarzem.

P501 Zawartość / pojemnik usunąć zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi

NFU 42-001

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Nr partii:

Data produkcji:

Termin przydatności:



CALFERT

ZALECENIA STOSOWANIA

UPRAWA	TERMINY I ZALECENIA	DAWKI
Jabłoni, Grusza	Pierwsze zabiegi wykonywać w czasie intensywnego wzrostu zawiązków owocowych, 4-6 zabiegów co 7-14 dni.	2-4 l/ha
	Wykonać 2-3 zabiegi w okresie dojrzewania owoców co 7 dni.	3-5 l/ha
Wiśnia, Czeresnia, Sliwa	Pierwsze zabiegi wykonywać w czasie wzrostu owoców, 2-4 zabiegi co 7-14 dni.	2-4 l/ha
	Wykonywać zabieg w czasie dojrzewania owoców, tuż przed zbiorami oraz pomiędzy zbiorami 1-2 zabiegi.	3-5 l/ha
Truskawki klasycznie owocujące	Pierwsze 2-4 zabiegi wykonywać po kwitnieniu, w czasie wzrostu owoców co 7 dni.	1-3 l/ha
	Wykonywać 2-3 zabiegi co 7 dni w czasie dojrzewania owoców.	2-3 l/ha
	Wykonywać zabiegi 3-4 razy w czasie zbiorów owoców, pomiędzy poszczególnymi zbiorami.	3-5 l/ha
Truskawki powtarzające owocowanie	Wykonać 4-6 zabiegów w czasie wzrostu i dojrzewania owoców, pomiędzy poszczególnymi zbiorami co 7 dni.	2-4 l/ha
Maliny	Wykonywać zabiegi 2-4 razy co 7-14 dni po kwitnieniu, w czasie wzrostu owoców.	2-4 l/ha
	Wykonywać 3-5 zabiegów w czasie dojrzewania owoców oraz pomiędzy zbiorami co 7 dni.	3-5 l/ha
Warzywa kapustne	Wykonywać zabiegi od momentu formowania się główki do zbioru co 7 dni.	2-5 l/ha
	Wykonać zabieg 1-2 razy w czasie zmiany warunków atmosferycznych.	2-5 l/ha
Pomidor, papryka uprawiane w gruncie	Wykonać zabieg po kwitnieniu, powtórzyć go po 7 dniach.	1-2 l/ha
	Wykonywać zabiegi w czasie wzrostu i dojrzewania owoców co 7 dni.	2-4 l/ha
	Wykonywać zabiegi między poszczególnymi zbiorami owoców, 2-3 zabiegi co 5 dni	2-5 l/ha
Pozostałe uprawy	Wykonywać zabiegi w czasie intensywnego wzrostu co 7-14 dni.	2-4 l/ha
	Wykonywać zabiegi przed zmianą warunków atmosferycznych, nie częściej niż co 7 dni.	2-4 l/ha

POJEMNOŚĆ

6L

Masa netto: 8,04 kg

