



FUNGICYD

Libreto

Zawartość substancji czynnej:

fenheksamid (związek z grupy hydroksyanilidów) - 500 g/l (42,73%)



Środek grzybobójczy do zwalczania patogenów szarej pleśni na plantacjach truskawek.

FUNGICYD



OPIS DZIAŁANIA

LIBRETO jest fungicydem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym. Na roślinie działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Substancja czynna fenheksamid zalicza się do inhibitorów syntezy steroli. Bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu szarej pleśni.



STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Uprawa	Dawka	Choroba	Termin stosowania	Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)
Truskawka	1,5 l/ha	szara pleśń (Botrytis cinerea)	W zwalczaniu szarej pleśni zaleca się stosowanie środka od fazy ukazania się pąków kwiatowych na dnie rozety, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami (BBCH 55-89)	truskawka – 1 dzień

Notatka:

Zalecana ilość wody: **500-1000 l/ha**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 7 dni**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Więcej na: www.novagra.com.pl



Solidna ochrona Twoich upraw.