




Skontaktuj się z nami

dr Michał Pniak
+48 662 043 388
m.pniak@biocont.pl

Katarzyna Woszczyk
+48 531 739 213
k.woszczyk@biocont.pl
Doświadczenia

Piotr Zieliński
+48 795 185 177
p.zielinski@biocont.pl
Mazowsze

Krzysztof Jędrzejowski
+48 570 809 123
k.jedrzejowski@biocont.pl
Wschodnia Polska

Rafał Powązka
+48 537 893 275
r.powazka@biocont.pl
Mazowsze

+48 530 654 218
Północno-centralna Polska

+48 570 056 123
Centralna Polska

Anna Puda-Sikora
+48 530 654 979
a.sikora@biocont.pl
Północno-zachodnia Polska

Sławomir Dułacz
+48 795 185 176
s.dulacz@biocont.pl
Zachodnia Polska

Mateusz Gracka
+48 530 565 792
m.gracka@biocont.pl
Południowa Polska

Biuro/zamówienia
+48 795 999 178
+48 12 416 25 81
zamowienia@biocont.pl

www.biocont.pl




LEPINOX PLUS®

**EFEKTYWNIE
ZWALCZA GĄSIENICE**

**Biologiczny insektycyd do zwalczania gąsienic w uprawach
warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych.**

- skutecznie zwalcza szerokie spektrum gąsienic
- wysoce selektywny
- brak pozostałości
- bez okresu karencji
- nie stwarza zagrożenia dla ludzi, środowiska oraz naturalnych wrogów szkodników i zapylaczy
- odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcaniu odporności na insektycydy
- do stosowania w ramach konwencjonalnej, integrowanej i ekologicznej produkcji
- dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych
- może być stosowany w ramach EKOSCHMATÓW „Biologiczna ochrona roślin” oraz „Integrowana produkcja roślin”
- długi okres przechowywania



Substancja aktywna:
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki,
szczep EG 2348

Koncentracja:
techniczna: 375 g/kg (37.5 % w/w)
bioaktywność: 32000 IU/mg T.ni

Formulacja:
proszek do sporządzania zawiesiny
wodnej

Opakowanie:
1 kg

Okres ważności:
3 lata

Zakres stosowania i dawki LEPINOX® PLUS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety, w szczególności ze zwrotami ostrzegawczymi oraz zasadami bezpieczeństwa stosowania.

	Szkodnik	Dawka	Zalecana ilość wody
UPRAWY SADOWNICZE			
jabłoń	zwójkówki liściowe*	1 kg/ha	250–500 l/ha
grusza	zwójka rdzaweczka*, gąsienice zwójkówek liściowych	1 kg/ha	250–500 l/ha
brzoskwinia, nektaryna	owocówka południoweczka*, skośnik brzoskwiniacek	1 kg/ha	250–500 l/ha
truskawka uprawiane w polu i pod osłonami	gąsienice motyli sówkowatych	1 kg/ha	400 – 600 l/ha
WARZYWA			
pomidor pod osłonami	słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych (np. błyszczka jarzynówka,piętnówka brukiewka, światłówka naziemnica), skośnik pomidorowy*	1 kg/ha	250–500 l/ha
papryka, sałata, ogórek (uprawiane w polu i pod osłonami)	światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych (np. błyszczka jarzynówka, piętnówka brukiewka, piętnówka kapustnica)	1 kg/ha	300 – 800 l/ha
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł uprawiane w polu	piętnówka kapustnica*, tantniś krzyżowiaczek*, bielinek kapustnik	1 kg/ha	300 – 500 l/ha
cukinia uprawiana w polu	słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych (np. rolnice)	1 kg/ha	300 – 600 l/ha
fasola uprawiana w polu	słonecznica orężówka, gąsienicemotyli sówkowatych (np. rolnice)	1 kg/ha	300 – 600 l/ha
endywia, cykoria (uprawiane w polu i pod osłonami)	błyszczka jarzynówka*	1 kg/ha	600 – 1000 l/ha
cebula, por, czosnek, szczypiorek (uprawiane w polu)	gąsienice motyli sówkowatych (np. rolnice)	1 kg/ha	300 – 600 l/ha
bób, ciecierzycza, groszek zielony cukrowy, soczewica, soja (uprawiane w polu i pod osłonami)	gąsienice motyli sówkowatych (np. rolnice)	1 kg/ha	300 – 600 l/ha
kukurydza pękająca, kukurydza cukrowa	omacnica prosowianka*	1 kg/ha	300 – 1000 l/ha
INNE			
winorośl	zwójka krzyżóweczka*, zwójka kwasigroneczka*	1 kg/ha	400 – 600 l/ha
chmiel	omacnica prosowianka*	1 kg/ha	800 – 2000 l/ha
bukszan	ćma bukszanowa*	1 kg/ha	400 – 600 l/ha


*zalecany monitoring występowania szkodnika w uprawie za pomocą pułapek feromonowych DELTA STOP.

Maksymalnie 3 zabiegi w odstępnach minimum 7 dniowych.
Zalecane 2-3 zabiegi w czasie występowania młodych gąsienic lub jaj w fazie czarnej główki.
Zabieg najlepiej wykonywać w czasie pochmurnej pogody.
Można mieszać z większością środków ochrony roślin oraz niektórymi nawozami dolistnymi, z wyjątkiem tych, których roztwór wykazuje wysoki odczyn zasadowy (np. ciecz bordoska) lub działanie bakteriobójcze.



Jak działa LEPINOX® PLUS?

- działa żółdkowo – musi być zjedzony przez gąsienice
- zaraz po spożyciu Lepinox® Plus zakażone gąsienice przestają żerować
- śmierć gąsienicy następuje zwykle po 2–3 dniach, martwe gąsienice z czasem czernieją



Jak stosować LEPINOX® PLUS?

- rośliny należy dokładnie pokryć cieczą użytkową, także od spodniej strony, a preparat powinien po oprysku pozostać na liściach i roślinach tak długo, jak to możliwe
- zabiegi najlepiej wykonywać w najchłodniejszej porze dnia, kiedy temperatura wynosi od 10°C do 20°C (zaleca się wykonać zabieg wcześniej rano lub wieczorem)
- unikać aplikacji w warunkach, w których temperatura przekracza 35°C
- optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj, ponieważ środek wykazuje najwyższą skuteczność w zwalczaniu najmłodszych stadiów larwalnych. Dlatego należy systematycznie sprawdzać czy na roślinach nie ma jaj lub małych gąsienic oraz czy wzrosła liczba motyli odłowionych do pułapek feromonowych
- w celu lepszego pokrycia liści zalecane jest łączne stosowanie Lepinox® PLUS z adiuwantem (np. na bazie pinolenów)
- w przypadku wystąpienia opadów do 48 godzin po aplikacji, zabieg należy powtórzyć
- nie mieszać środka z produktami silnie zasadowymi lub o działaniu bakteriobójczym
- nie należy używać wody o pH>8, w przeciwnym razie powinno się zastosować środek zakwaszający



Racjonalna ochrona wymaga stosowania monitoringu

W celu uchwycenia początku nalotu szkodnika na plantacje należy zastosować pułapki feromonowe. Monitoring pozwala określić jak duża jest presja ze strony szkodnika oraz pomaga wyznaczyć optymalny termin zabiegu ochronnego. Jest to szczególnie ważne kiedy decydujemy się na biologiczne środki o działaniu żółdkowym, do których należy Lepinox® PLUS.